

## Covid-19 : quel test utiliser ?

Vous avez des <b>symptômes</b> de Covid-19	Vous n'avez <b>pas</b> de <b>symptômes</b> de Covid-19	
	Vous êtes personne-contact (isolée ou au sein d'un cluster)	Vous n'êtes pas une personne-contact
<b>Test antigénique dans les 4 jours suivant l'apparition des symptômes</b> , dès lors que qu'un résultat de test RT-PCR ne peut pas être obtenu en moins de 48h	<b>Test RT-PCR</b> (recommandation susceptible d'être revue dès que des données seront disponibles)	<b>Pas de test</b>
Cas particulier des personnes présentant un risque de développer une forme grave de Covid-19 <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Si le test antigénique est négatif ou non interprétable, contrôle par test RT-PCR</b></li><li>- Consultez votre médecin traitant (consultation ou téléconsultation)</li></ul>		Sauf dans le cadre d'un dépistage organisé en population ciblée (par exemple au sein d'une université, chez les soignants d'un hôpital...) <b>Test antigénique</b>
Si prélèvement nasopharyngé impossible ou difficile, test RT-PCR sur prélèvement <b>salivaire</b>	Si prélèvement nasopharyngé impossible ou difficile, test RT-PCR sur prélèvement <b>oropharyngé</b>	

Le test RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé reste le test de référence pour la détection du virus SARS-CoV-2. Les recommandations ci-dessus ne concernent pas les personnes hospitalisées. Source : avis HAS du 8 octobre 2020.